



ПОСТАБОРТНЫЙ СИНДРОМ

Я не знаю, у кого из людей сердца так сломаны, как сердца женщин после аборта.

Доктор Сьюзен Стенфорд

Постабортный синдром — это сочетание психических симптомов или заболеваний, которые проявляются в следствие переживаний после аборта. Доказано, что как минимум две женщины из трех после аборта испытывают тяжелые депрессии, которые сопровождаются:

- потерей внутреннего покоя и жизненных ориентиров;
- разрушением отношений доверия между супругами;
- сексуальным безразличием, неприязнью и отчуждением;
- агрессией и конфликтами в семье и на работе.

В результате аборт часто становятся причинами распада семей. Сотни женщин признавались в том, что не могут любить того мужчину, из-за которого прервали свою беременность. Женщина не может простить мужчине того, что он не захотел взять на себя ответственность за ее судьбу и судьбу ребенка. А мужчина, даже если он сам склонял женщину к абарту, начинает подсознательно ожидать, что агрессия, направленная при абарте на его ребенка, может обратиться на него самого. Женщина уже не привлекает его, а внушает чувство опасности.

Аборт — единственное медицинское вмешательство, итогом которого является не улучшение здоровья пациента, а вред: здоровье женщины существенно подрывается, а ребенок — лишается жизни насильственным путем.

ДОКАЗАНО, ЧТО ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ! 46 человеческих хромосом, которыми сразу после оплодотворения яйцеклетки обладает этот маленький человек, определяют его пол, группу крови, рост, черты лица, цвет глаз и волос, темперамент, творческие способности и т.п.

Уже через 18 дней после зачатия начинает биться сердечко.

На 21-й день приходит в действие собственная кровеносная система: кровь ребенка не смешивается с кровью матери и может отличаться от нее по группе.

В 8 недель (рост 1,4 - 2,2 см) ребенок может сосать свой пальчик, начинает реагировать на поглаживание живота, хотя мать пока еще не ощущает его шевелений.

В 12 недель (рост 6 см) малыш реагирует на свет, тепло и шум. Он спит и просыпается, энергично упражняет свои мышцы, поворачивая головку, сгибая пальчики на ручках и ножках.



Сохранить эту новую жизнь, встретить своего малыша улыбкой — это предназначение и счастье для каждой женщины!

Мы поможем вам почувствовать радость материнства!

Центр защиты материнства «Колыбель»
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, кв. 466
Тел. (343) 344-355-4
Телефон доверия: 8 800 2000-507
www.kolybel-ural.ru, www.ekbmiloserdie.ru



ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА

В основе этого буклета — многолетний опыт врачей, которым в своей практике приходится иметь дело с осложнениями от абортов и нарушениями детородной способности женщин. Он призван рассказать женщинам, которые находятся в трудной ситуации в связи с беременностью, к каким последствиям приводит аборт, и помочь сделать правильный выбор в пользу сохранения жизни своих малышек.

Беременность — это нормальное физиологическое состояние женского организма, который в первые же часы после оплодотворения яйцеклетки настраивается на вынашивание, рождение и вскармливание ребенка. Но в результате аборта гормональные процессы в организме грубо нарушаются, что всегда приносит непоправимый вред женскому здоровью и часто ведет к бесплодию. **Доказано, что каждый четвертый случай материнской смертности связан с последствиями абортов!** (Информация со ссылкой на «Семья в России» 1995. № 3-4. С. 113)

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

В этом случае маленький ребенок вместо матки остается в маточной трубе, которая, по мере развития беременности, может разорваться и вызвать внутреннее кровотечение. Вовремя распознать внематочную беременность сложно, и даже хирургическое вмешательство не всегда помогает сохранить материнскую жизнь.



ИСТИМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Травмированная при аборте шейка матки при следующей беременности не может выдержать давление ребенка, поэтому на 14-16 неделе часто происходит выкидыш. Если беременность все же удастся сохранить, то загрубевшая от предыдущих абортов мышечная ткань препятствует растяжению матки, и в ходе родов это приводит к разрывам и обильным кровотечениям.

ДИСТОЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Встречается ситуация, когда шейка матки при родах из-за послеабортных рубцовых изменений не раскрывается совсем. Тогда

врачам приходится прибегать к кесареву сечению — сложной полостной операции под глубоким наркозом.

ЭНДОМЕТРИОЗ

При травмах стенки матки эндометриоидные частицы, словно споры, начинают «прорастать» в мышечный слой, а затем могут проникнуть с кровью в другие органы. Это может привести к воспалениям, болезненности половых актов и бесплодию.

ДИСКООРДИНАЦИЯ И СЛАБАЯ РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В этих случаях матка сокращается слабо и нерегулярно, что затягивает процесс родов и вынуждает врачей стимулировать процесс медикаментами, а если они не помогают — младенца извлекают акушерскими щипцами. Это приводит к травмам головы и шеи ребенка, а часто и к детскому церебральному параличу (ДЦП).



АБОРТ — ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ

При аборте стенки матки выскабливают особым петлеобразным ножом. Даже самый опытный врач не может дать гарантии, что не произойдет прободения матки, т.к. процесс проводится практически вслепую. Внутренняя поверхность матки при этом

травмируется и позже заменяется рубцовой тканью. Имплантация эмбриона при последующих беременностях будет значительно затруднена.



АБОРТ — УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ БУДУЩИХ ДЕТЕЙ

Рубцовые изменения в матке, как следствие предыдущих абортов, в следующую беременность отражаются, в первую очередь, на коре головного мозга будущего ребенка, его дальнейшем психическом и интеллектуальном развитии.



АБОРТ — ПРИЧИНА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

У женщин, прибегающих к абортam, из-за нарушения гормонального фона организма часто встречается рак молочных желез, шейки матки, щитовидной железы, злокачественные опухоли в брюшной полости.



ВАЖНО! Внутриматочные спирали и гормональные противозачаточные препараты фактически имеют abortивный эффект — они прерывают жизнь ребенка на самых ранних стадиях развития. При этом использование этих средств наносит здоровью женщины серьезный вред.

• ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА •

• ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА •